

Осторожно, спайсы убивают!

Последствия употребления курительных смесей.

Употребление курительных смесей вызывает:

- развитие психической и физической зависимости также как и при употреблении других видов наркотических веществ;
- поражение центральной нервной системы, как следствие, снижение памяти, внимания, интеллектуальных способностей, нарушения речи, мыслительной деятельности (понимания), координации движений, режима сна, потеря эмоционального контроля (резкие перепады настроения);
- психозы;
- психические нарушения различной степени тяжести вплоть до полного распада личности (подобные при шизофрении);
- дипрессии;
- изменение генетического кода (как следствие, негативное воздействие на репродуктивную систему: врожденные аномалии у потомства);
- снижение иммунитета;
- нарушение гормонального фона;
- риск развития сахарного диабета, рака легких и т. д.;
- поражение сердечно - сосудистой системы;
- отравление от передозировки, смерть.

Признаки отравления курительными смесями:

- рвота,
- судороги,
- подъем артериального давления,
- учащенное сердцебиение,
- галлюцинации,
- психоз,
- отсутствие реакции на внешние раздражители,
- коматозное состояние.

При появлении первых признаков отравления необходимо срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, иначе не исключен летальный исход.

Социально-педагогические последствия употребления курительных смесей, характерные для наркомании:

Разрушение своей личности: равнодушие к самому себе, своему будущему и близким людям, ослабление воли, преобладание единственной ценности по имени «наркотик», потеря смысла жизни, опустошенность, одиночество и др.;

Разрушение социальных связей: потеря семьи, друзей, потеря работы, учебы, ограничения в получении специальности, невозможности вождения транспорта, получения разрешения на приобретение оружия, запрет на некоторые виды профессиональной деятельности и т.д.;

Связь с криминальными кругами, риск вовлечения в незаконный оборот наркотиков и привлечения к уголовной ответственности, воровство и другие преступления.

Симптомы употребления курительных смесей

(зависит от дозы, стадии опьянения, стажа употребления):

- Расширенный или (реже) суженный зрачок, мутный, либо покрасневший белок глаз (поэтому носят с собой «Визин» и другие глазные капли)
- Повышенная двигательная – эмоциональная активность
- Повышенный аппетит
- Сухость во рту
- Бледность
- Галлюцинации, кошмарные видения
- Агрессия
- Учащенное сердцебиение
- Неспособность сосредоточиться
- Нарушение восприятия
- Бесконтрольный смех
- Полная потеря контакта с окружающим миром
- Отсутствие способности ориентироваться в пространстве
- Потеря самоконтроля
- Нарушение координации
- Дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитной пленки)
- Заторможенность мышления (тупит)
- Неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании (если сильно обкурился, минут 20-30)